

MỘT SỐ THUỐC CHỐNG CHỈ ĐỊNH DÙNG  
CHO PHỤ NỮ CÓ THAI:

STT	Thuốc	Tác động bất lợi lên thai nhi	Thời gian nguy cơ
<b>IV. Thuốc kháng sinh:</b>			
14	Cloramphenicol	Dùng cho phụ nữ mang thai gần đến kỳ sinh nở hoặc trong khi chuyển dạ có thể gây hội chứng xám ở trẻ sơ sinh.	Trong thai kỳ
15	Doxycycline	Ảnh hưởng đến sự phát triển của răng và xương của bào thai	Sau tuần thứ 15 của thai kỳ
16	Metronidazole	Thuốc qua hàng rào nhau thai khá nhanh và vào tuần hoàn thai nhi	3 tháng đầu thai kỳ
17	Tetracycline	Ảnh hưởng đến sự phát triển của răng và xương của bào thai	Sau tuần thứ 15 của thai kỳ
<b>V. Thuốc tim mạch:</b>			
18	Candesartan cilexetil + Hydrochlorothiazid ( Acantan HTZ 8-12.5)	Gây độc trên bào thai (giảm chức năng thận, thiếu ôi, chậm cốt hóa xương sọ)	3 tháng đầu và 3 tháng cuối kỳ
19	Enalapril (Erilcar 5mg, Erilcar 10mg)	Thiếu năng thận, ít dịch ối và chậm phát triển	3 tháng giữa và 3 tháng cuối
20	Lisinopril		
21	Atenolol (Tenocar 100 mg, Tenocar 50 mg)	Làm thai chậm phát triển	Trong thai kỳ
22	Telmisartan + Amlodipin (Twynsta 40mg/5mg, Twynsta 80mg/5mg)	Gây độc trên bào thai (giảm chức năng thận, thiếu ôi, chậm cốt hóa xương sọ)	3 tháng giữa và 3 tháng cuối
<b>VI. Thuốc trị mụn:</b>			
23	Isotretinoin	Gây quái thai	Trong thai kỳ
24	Nhóm retinoid (axit retinoic, retinol, adapalene, tretinol...)	Gây dị tật thai nhi và ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi	Trong thai kỳ

