


MỘT SỐ THUỐC CHỐNG CHỈ ĐỊNH DÙNG
CHO PHỤ NỮ CÓ THAI:



STT	Thuốc	Tác động bất lợi lên thai nhi	Thời gian nguy cơ
VII. Các nhóm thuốc khác:			
25	Midazolam	Dùng midazolam trước khi mổ lấy thai gây ức chế ở trẻ sơ sinh	3 tháng cuối thai kỳ
26	Misoprostol	Gây sảy thai	Trong thai kỳ
27	Metformin (Metformine EG 1000mg)	Tránh dùng Không nên dùng. Insulin là thuốc lựa chọn để kiểm soát đái tháo đường trong thời kỳ này.	Trong thai kỳ
28	Colchicin	Tránh dùng	Trong thai kỳ
29	Atosiban (Tractocile 37,5mg/5ml)	Chỉ nên được sử dụng khi sự chuyển dạ sinh non được chẩn đoán sinh non có tuổi thai từ 24 tuần tới đủ 33 tuần của thai kỳ	Trước tuần 24 và sau tuần 33; vỡ ối sau tuần 30
30	Piracetam	Thuốc qua được nhau thai	Trong thai kỳ

Tài liệu tham khảo:

1. Dược thư Quốc gia năm 2018 (Xuất bản lần thứ 2)
2. Tờ Hướng dẫn sử dụng thuốc
3. www.nhipcauduoclamsang.com

